

Nom du médicament	Indication	Coût probable pour le régime
Solution ophtalmique DuoTrav	Traitement du glaucome ou hypertension oculaire	\$
Comprimé Hepsera de 10mg	Traitement d'hépatite B chronique à lamivudine-résistante ou d'hépatite B chronique chez les patients affectés du SIDA et qui ne requièrent pas de traitement VIH	\$\$

\$ Peu de hausse des dépenses du régime  
\$\$ Hausse relative des dépenses du régime  
\$\$\$ Probable forte hausse des dépenses du régime

## Enablex et Trosec – Nouvelles options pour le contrôle de la vessie

La vessie super active ("VSA") est un problème auquel les canadiens font face de plus en plus en vieillissant. On estime que plus de 1,5 million de canadiens souffrent de perte de contrôle de la vessie ou des intestins; la majorité consistant d'adultes âgés<sup>1</sup>. Parmi les ménages canadiens, 25% de femmes et 10% d'hommes souffrent d'incontinence urinaire et le pourcentage monte jusqu'à 50% de femmes et d'hommes âgés vivant dans des institutions.

Les thérapies non pharmacologiques comprennent un changement de mode de vie, (tel que la cessation de la consommation de la caféine et de l'alcool) et de comportement (tel qu'exercices d'entraînement de la vessie et du bassin) dans le but de prévenir la perte d'urine<sup>2</sup>. On peut obtenir de meilleurs résultats en combinant ces stratégies avec des traitements utilisant des médicaments ou des traitements avec des médicaments seulement.

Les agents anticholinergiques sont le traitement de médicaments de préférence pour VSA. Les agents anticholinergiques bloquent les sites de récepteurs muscariniques, entravant ainsi les contractions de la vessie (lesquelles causent une pression et une perte d'urine) et stabilisant le muscle de la vessie. Présentement, les agents disponibles comprennent des formulations de dégagement immédiat et prolongé de Ditropan® (oxybutynine) et Detrol® (toltérodine).

Enablex et Trosec représentent de nouvelles options dans le traitement de VSA. Ils sont tous deux des antagonistes sélectifs de récepteurs, c'est à dire, ils visent les récepteurs muscariniques spécifiquement dans la vessie. De cette façon, on réduit les effets secondaires - surtout dans le système nerveux central. Les symptômes peuvent comprendre la somnolence, l'incohérence ou la confusion chez les patients qui souffrent de démence. Les effets secondaires les plus communs d'Enablex et de Trosec sont la sécheresse de la bouche, la constipation et les maux de tête. Trosec se prend deux fois par jour avant de manger et Enablex une fois par jour avec ou sans nourriture.

Enablex coûte 1,58\$ par jour et Trosec coûte 1,50\$ par jour. Par contraste, Detrol® à dégagement immédiat coûte 1,92\$ par jour et la version à dégagement prolongé coûte 1,93\$ par jour. Ditropan® et Detrol® sont entièrement couverts en vertu de tous les programmes de médicaments de Sécurité Indemnité. Non seulement Enablex et Trosec ont-ils moins d'effets secondaires, ils coûtent également moins cher. Donc, Enablex et Trosec seront entièrement couverts en vertu de TOUS les programmes de médicaments de Sécurité Indemnité, y compris les **listes gérées**. Si vous avez besoins d'informations supplémentaires au sujet d'Enablex ou Trosec, veuillez communiquer avec Shellina Sevany du département des Services Cliniques de Sécurité Indemnité au (905) 949-3025 ou 1-888-479-7587 poste 3025.

### Recommandation: Couverture Complète

Sécurité Indemnité se réserve le droit de modifier en partie ou en entier ses lignes guides sur ses programmes cliniques d'Autorisation Spéciale

#### Bibliographie:

1. Incontinence. [Ottawa]: Santé Canada: Échange d'info. pour aînés 1999. Accédé le 10 mai 2006 au URL: [http://www.hc-sc.gc.ca/seniors-aines/pubs/info\\_exchange/pdf/incontinence\\_e.pdf](http://www.hc-sc.gc.ca/seniors-aines/pubs/info_exchange/pdf/incontinence_e.pdf).
2. Hashim H, Abrams P. Drug treatment of overactive bladder: efficacy, cost and quality-of-life considerations. *Médicaments*. 2004; 64(15): 1643-56.

