



Produits récemment introduits

VOLUME VI, NUMÉRO 10

Nom du médicament	Indication	Effets potentiels	Coût annuel moyen prévu
Avamys™	Pour le traitement de la rhinite allergique saisonnière et des symptômes s'y rapportant chez les patients âgés de 12 ans ou plus.	\$	291\$
Emend™	Pour la prévention de nausées aiguës et tardives et du vomissement causés par la chimiothérapie pour le traitement du cancer.	\$	N/A

\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de <1 %*
 \$\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de 1 à 5 %*
 \$\$\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de >5 %*

Avastin® – Progrès dans le traitement du cancer métastatique du côlon (CRC)

Le cancer colorectal est la deuxième principale cause de décès causé par le cancer et le troisième cancer le plus commun au Canada. Le taux de survie de cinq ans chez les patients atteints de cancer métastatique colorectal et avancé est de moins de 10%. Le traitement du cancer métastatique du colon consiste surtout de chimiothérapie. Sans la chimiothérapie, la moyenne de survie chez les patients atteints de CMC est environ de 6 mois.¹

Avastin® est un anticorps monoclonal; il n'est pas un agent chimiothérapeutique. Il s'administre en conjonction avec la chimiothérapie pour le traitement du CMC. Pendant que la chimiothérapie attaque la tumeur cancéreuse directement, Avastin® bloque les vaisseaux sanguins qui entourent la tumeur. Avastin® bloque la croissance de la tumeur cancéreuse en supprimant la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins qui nourrissent la tumeur et finalement lui permettent de grossir (effet antiangiogénique). En prévenant la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins, Avastin® affame la tumeur d'oxygène et d'autres substances nutritives. Avastin® s'est prouvé efficace lorsque employé avec d'autres agents chimiothérapeutiques et lorsque ajouté à des médicaments chimiothérapeutiques standard pour CMC, la survie des patients s'améliore de 4.7 mois.¹

La posologie recommandée d'Avastin® est de 5mg/kg du poids du corps tous les 14 jours par infusion intraveineuse pendant la progression de la maladie. L'infusion intraveineuse d'Avastin® dure 90 minutes.² Donc pour un patient dont le poids moyen est de 70 kg et pour la moyenne de durée de traitement de 8 mois, Avastin® coûte environ 30 300\$ par année.

Au Canada, la plupart des régimes provinciaux de médicaments sont responsables de la chimiothérapie pour cancer et puisque Avastin® est administré dans un milieu d'hôpital, il est exclus de tous les formulaires de SécuritéIndemnité. Présentement, au Canada, Avastin® est couvert en Colombie Britannique par l'agence de cancer de CB, à Terre-Neuve/Labrador et certains hôpitaux du Québec selon les directives d'admissibilité établies par chaque hôpital. Dans les autres provinces, y compris l'Ontario, Avastin® n'est pas admissible de couverture ni en vertu des formulaires provinciaux, ni en vertu des différentes agences ou comités provinciaux sur le cancer, ni en vertu d'aucun budget d'hôpital.

Le fabricant d'Avastin®, Hoffmann-La Roche Ltd., a établi un programme d'aide au patient, conçu pour assister et supporter les oncologues, hématologues et finalement les patients. Pour plus d'informations ou pour faire la demande d'un formulaire d'adhésion pour un patient, veuillez téléphoner au 1-888-748-8926.

Si vous désirez couvrir Avastin® en vertu de votre régime, veuillez communiquer avec votre Représentant, Service aux Clients. Si vous désirez des renseignements supplémentaires au sujet de Avastin®, veuillez communiquer avec Shellina Sevany, directrice, Services cliniques, au 905-949-3025 ou au 1-888-479-7587, poste 3025.

Recommandation: Exclure

SécuritéIndemnité se réserve le droit de modifier en partie ou en entier ses lignes guides sur ses programmes d'Autorisation Spéciale

Bibliographie :

- 1) Avastin® Payeur privé – reliure de soumission. Hoffman-Laroche Ltd., le 16 septembre 2005
- 2) Avastin® Produit monographique, Hoffman-Laroche Ltd., le 21 septembre 2007

