



Produits récemment introduits

VOLUME VI, NUMÉRO 11

Nom du médicament	Indication	Effets potentiels	Coût annuel moyen prévu
Comprimé Atripla®	S'utilise seul, comme un schéma posologique complet ou en combinaison avec d'autres agents antirétroviraux pour le traitement de l'infection à VIH-1 chez les adultes.	\$\$	14 490 \$
Comprimé Ralivia ^{MC}	Pour la gestion de la douleur moyennement forte chez les adultes qui nécessitent un traitement continu sur plusieurs jours ou plus.	\$	419,75 \$ - 1 113,25 \$
Risperdal Consta ^{MC}	Pour la gestion des manifestations de la schizophrénie et des troubles psychiatriques connexes.	\$	137,28 \$

\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de <1 %* \$\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de 1 à 5 %* \$\$\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de >5 %*

Emend^{MC} - Une thérapie efficace contre la nausée et le vomissement provoqués par la chimiothérapie

En 2007, on prévoit environ 159 900 nouveaux cas de cancer au Canada. Les traitements de chimiothérapie anticancéreux consistent en plusieurs cycles incluant des schémas posologiques types de quatre à six cycles. Les schémas posologiques incluant de nombreux médicaments sont très courants et représentent la majorité des traitements administrés au cancéreux. Chaque médicament additionnel ajouté au schéma posologique de chimiothérapie augmente les risques de nausée et de vomissement provoqués par la chimiothérapie.¹

La nausée et le vomissement provoqués par la chimiothérapie causent de graves problèmes chez un grand nombre de patients recevant de la chimiothérapie. Un contrôle inadéquat de la nausée et du vomissement peut entraîner une diminution de l'adhésion au traitement chimiothérapeutique, ce qui pourrait réduire les avantages thérapeutiques des médicaments et leur rentabilité. La détresse associée à la nausée et au vomissement provoqués par la chimiothérapie pourrait entraîner le refus de la cancérothérapie la plus cliniquement efficace et la plus rentable. Des études cliniques démontrent qu'un retard quant à l'administration d'un traitement chimiothérapeutique ou que la réduction des doses de chimiothérapie peut causer des résultats suboptimaux et, à la limite, une diminution de la qualité de vie et/ou une hausse de l'absentéisme. Les patients peuvent même abandonner la chimiothérapie si la nausée et le vomissement provoqués par la chimiothérapie sont graves. La nausée et le vomissement non contrôlés peuvent causer une déshydratation, la fracture des os et une perte de poids, symptômes qui s'ajoutent à l'exacerbation de la perte de poids et de la malnutrition souvent constatés chez les patients atteints du cancer.¹

L'Emend^{MC} est un nouveau médicament antiémétique (empêche ou atténue le vomissement) qui agit au niveau du cerveau. L'Emend^{MC}, utilisé en combinaison avec deux autres médicaments (un antagoniste du récepteur 5-HT₃ et la dexaméthasone), est approuvé pour la nausée et le vomissement associés à une chimiothérapie anticancéreuse hautement émétogène.² On a remarqué des améliorations importantes chez près de 20,9 % des patients à qui on a ajouté l'Emend^{MC} dans le schéma posologique antiémétique, par comparaison aux médicaments antiémétiques offerts antérieurement (un antagoniste du récepteur 5-HT₃ et un corticostéroïde, comme la dexaméthasone).¹

L'Emend^{MC} se prend le premier jour de la chimiothérapie et de nouveau les 2^e et 3^e jours. Le schéma posologique antiémétique sur 3 jours de l'Emend^{MC} coûte environ 90,54 \$ par cycle de chimiothérapie tandis que le schéma posologique sur 5 jours qui était offert auparavant (un antagoniste du récepteur 5-HT₃ et un corticostéroïde) coûtait entre 45,70 \$ et 182,80 \$ par cycle de chimiothérapie.

Les clients de SécuritéIndemnité incluront automatiquement l'Emend^{MC} dans les formulaires de médicaments ouverts courants ainsi que dans les formulaires gérés.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires au sujet de l'Emend^{MC}, veuillez communiquer avec Shellina Sevany, directrice, Services cliniques, au 905-949-3025 ou au 1-888-479-7587, poste 3025.

Recommandation : Couverture complète

SécuritéIndemnité se réserve le droit de modifier en partie ou en entier ses lignes guides sur ses programmes d'Autorisation Spéciale

Bibliographie:

- 1) Emend^{MC} Private Payer Submission Binder. Merck Frosst Canada Inc., septembre 2007
- 2) Monographie de l'Emend^{MC} Product Monograph. Merck Frosst Canada Inc., 23 Août 2007

HEALTH LIBRARY | MENU SANTÉ



claimsecure.com / securindemnite.com

* Basé sur l'analyse des répercussions financières pour 100 000 vies

© 2007 SécuritéIndemnité inc.