



Produits récemment introduits

VOLUME VII, NUMÉRO 11

Nom du médicament	Indication	Effets potentiels	Coût annuel moyen prévu
Xarelto	Prévention des événements thromboemboliques veineux chez les patients ayant subi une arthroplastie totale élective de la hanche (ATH) ou du genou (ATG)	\$	243,04 \$
Travatan Z	Traitement de la pression intraoculaire élevée en cas de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire	\$	394 \$

\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance médicaments de < 1 %*
 \$\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance médicaments de 1 à 5 %*
 \$\$\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance médicaments de > 5 %*

Nevanac[®] – Nouvelle option thérapeutique après une chirurgie de la cataracte

Les cataractes sont une des principales causes de déficience visuelle au Canada et comptent pour environ 48 % des cas de cécité à l'échelle mondiale¹. Une cataracte est une opacification du cristallin, la lentille de l'œil. Dans le cas où la cataracte n'est pas traitée, le cristallin perd progressivement sa transparence et empêche la lumière de pénétrer dans l'œil, entraînant une déficience visuelle variable et parfois la cécité².

Les cataractes sont le plus souvent liées à l'âge; elles peuvent apparaître dans la quarantaine et évoluer lentement au fil des ans. L'exposition prolongée aux rayons ultraviolets, les antécédents familiaux, des maladies telles que le diabète et l'hypertension ainsi que l'exposition excessive à certains médicaments comptent parmi les facteurs de risque de cataracte. Le traitement consiste en l'excision chirurgicale du cristallin, qui est ensuite remplacé par un cristallin artificiel permanent². Malgré le perfectionnement des techniques chirurgicales, cette procédure effractive peut causer une inflammation postchirurgicale. L'inflammation peut entraîner de la douleur et des complications chirurgicales qui nuisent à la guérison, d'où l'importance de soins adéquats à la suite de la chirurgie³.

Les traitements actuels de l'inflammation postopératoire comprennent les anti-inflammatoires topiques non stéroïdiens (AINS) en suspension et les corticostéroïdes, souvent utilisés en association. Nevanac[®] (suspension ophtalmique de népafénac, 0,1 %) a récemment été approuvé pour le traitement de la douleur et de l'inflammation associées à l'opération de la cataracte. Nevanac[®] est aussi efficace que les autres AINS topiques actuels de cette classe (Voltaren[®], Acular[®], etc.) pour réduire la douleur et l'inflammation. Nevanac[®] est appliqué trois fois par jour, comparativement à quatre fois par jour pour Voltaren, ce qui pourrait entraîner une meilleure observance thérapeutique de la part du patient et permettre des économies en réduisant le nombre de flacons requis pour un traitement complet³.

Le coût d'un traitement complet par Nevanac[®] est d'environ 73,92 \$, ce qui est comparable au coût de Voltaren[®]. Puisque Nevanac[®] sera utilisé pour le traitement de courte durée, il sera entièrement couvert par TOUS les régimes d'assurance médicaments SécuritéIndemnité, y compris par les listes de médicaments de SécuritéIndemnité.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires au sujet de Nevanac[®], veuillez communiquer avec Shellina Sevany, directrice, Services cliniques, au 905-949-3025 ou au 1-888-479-7587, poste 3025.

Recommandation : Couverture complète

SécuritéIndemnité se réserve le droit de modifier en partie ou en entier ses lignes guides sur ses programmes d'Autorisation Spéciale

Bibliographie :

- 1) Belisle S, Blake J et coll. Conférence canadienne de consensus sur la ménopause – Mise à jour 2006. *J Obstet Gynaecol Can.* 2006; 28 (2 Suppl 1) : S7-S94.
- 2) Archer, DF. Low-dose hormone therapy for postmenopausal women. *Clin Obstet Gynecol.* 2003;46(2) : 317-24.
- 3) Actuelle^{MC} Dossier de demande de remboursement par les assureurs privés. Novo Nordisk Canada, Avril 2008.



claimsecure.com / securindemnite.com

* Basé sur l'analyse des répercussions financières pour 100 000 vies

© 2008, SécuritéIndemnité inc.