



## Produits récemment introduits

Nom du médicament	Indication	Effets potentiels	Coût annuel moyen prévu
Metrogel 1 %, préparation topique	Pour le traitement des papules et des pustules inflammatoires, ainsi que de l'érythème de la rosacée.	\$	219 \$
Clobex, vaporisateur topique	Pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à grave.	\$	788,40 \$

\$ : Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de <1 %\* \$\$ : Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de 1 à 5 %\* \$\$\$ : Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de >5 %\*

## Suboxone<sup>MC</sup> – Une nouvelle thérapie d'entretien de substitution pour la dépendance aux opioïdes

**Suboxone<sup>MC</sup>** est un comprimé sublingual (qui se dissout sous la langue) combinant deux médicaments – la buprénorphine et la naloxone (2 mg et 0,5 mg ou 8 mg et 2mg) – utilisé comme traitement substitutif de la dépendance aux opioïdes.<sup>1</sup>

La dépendance aux opioïdes est une condition rémittente chronique. Traditionnellement, on a associé la principale cause de dépendance aux opioïdes à la consommation illicite d'héroïne. Toutefois, la réalité actuelle est que l'utilisation illégale d'opioïdes comprend des opioïdes légalement offerts sur ordonnance, dont l'oxycodone, la codéine, la morphine et l'hydromorphone, comme le signalait une étude canadienne menée auprès de personnes dépendantes aux opioïdes participant à un programme torontois de maintien à la méthadone.<sup>2</sup> La dépendance aux opioïdes réfère non seulement à un usage de drogues illicites, mais aussi à un comportement dysfonctionnel qui interfère avec un fonctionnement normal au quotidien, des conséquences graves sur la santé, en particulier chez les utilisateurs de drogues injectables, une augmentation de la prévalence et de l'incidence des conditions morbides (hépatite B, hépatite C et VIH), et d'importantes conséquences sociales.<sup>3</sup>

À l'heure actuelle, le seul autre médicament disponible pour gérer la dépendance aux opioïdes est la méthadone. La méthadone est dissoute dans des cristaux de breuvage et est prise oralement pour éviter le détournement et l'injection. Même si la méthadone constitue un traitement substitutif efficace, une surveillance plus étroite du patient est nécessaire en raison des forts symptômes de sevrage, de la mortalité accrue causée par les surdoses, des risques cardiaques et de la dépression respiratoire potentiels, ainsi que d'un processus de désintoxication plus long. De plus, les patients qui prennent de la méthadone risquent, avec le temps, de développer une dépendance à la méthadone elle-même.

Suboxone<sup>MC</sup>, en comparaison, est aussi efficace que la méthadone pour éliminer l'état de manque aux opioïdes, mais son ingrédient actif, la buprénorphine, détient un meilleur profil d'innocuité (en ce qui touche les risques précédemment mentionnés). Avec Suboxone<sup>MC</sup>, il n'y a aucun effet euphorisant à doses plus élevées, ce qui diminue les propriétés accoutumantes de Suboxone<sup>MC</sup>. L'autre avantage de Suboxone<sup>MC</sup> par rapport à la méthadone réside dans sa durée d'action plus longue, qui permet un dosage d'entretien tous les 2 à 3 jours plutôt que chaque jour, comme le requiert la méthadone. Le coût annuel du traitement substitutif avec Suboxone<sup>MC</sup> est d'environ 1 608 \$. Suboxone<sup>MC</sup> sera entièrement couvert par TOUS les régimes d'assurance-médicaments de SécurIndemnité, y compris les listes de médicaments de SécurIndemnité.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires au sujet de Suboxone<sup>MC</sup>, veuillez communiquer avec Shellina Sevany, directrice, Services cliniques, au 905-949-3025 ou au 1-888-479-7587, poste 3025.

### Recommandation : Couverture complète

SécurIndemnité se réserve le droit de modifier en partie ou en entier ses lignes guidées sur ses programmes d'Autorisation Spéciale

#### Bibliographie:

- 1) Monographie de Suboxone<sup>MC</sup>. Schering-Plough Canada, 17 mai 2007.
- 2) Fischer B et al. Illicit opioid use and its key characteristics: A select overview and evidence from a Canadian multisite cohort of illicit opioid users (OPICAN). Can J Psychiatry 2006a;51:624-634.
- 3) Suboxone<sup>MC</sup> Cartable de dépôt du tiers payant privé. Schering-Plough Canada, janvier 2008.

HEALTH LIBRARY | MENU SANTÉ



claimsecure.com / securindemnite.com

\* Basé sur l'analyse des répercussions financières pour 100 000 vies

© 2008, SécurIndemnité inc.