



Produits récemment introduits

Nom du médicament	Indication	Effets potentiels	Coût annuel moyen prévu
Atacand [®] , comprimé de 32 mg	Pour le traitement de l'hypertension essentielle d'intensité légère à modérée	\$	416,00 \$
DermOtic [®] Oil, gouttes otiques à 0,01 %	Pour le traitement de l'otite externe eczémateuse chronique d'intensité modérée à grave chez les adultes et les enfants âgés d'au moins 12 ans	\$	243,00 \$

\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de < 1 %*
 \$\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de 1 à 5 %*
 \$\$\$: Augmentation prévue des dépenses au régime d'assurance-médicaments de > 5 %*

Relistor^{MC} – Traitement de la constipation causée par les opioïdes chez les patients atteints d'une maladie avancée

Relistor^{MC} est le premier produit à être approuvé pour le traitement de la constipation causée par les opioïdes chez les patients atteints d'une maladie avancée et recevant des soins palliatifs¹. Parmi les patients atteints d'une maladie avancée, telle qu'un cancer incurable, un emphysème au stade terminal, une maladie cardiovasculaire/insuffisance cardiaque, la maladie d'Alzheimer/démence ou le VIH/sida, près de 86 % reçoivent des opioïdes et presque 90 % d'entre eux souffrent de constipation².

Les récepteurs opioïdes sont présents dans le système nerveux central, de même qu'à la périphérie du tractus gastro-intestinal. L'activation des récepteurs opioïdes périphériques entraîne le ralentissement du tractus gastro-intestinal, occasionnant alors des selles sèches et dures, ainsi qu'une constipation causée par les opioïdes³. Ce type de constipation est traité par des laxatifs stimulants et des laxatifs émoullissants en vente libre. Cependant, de nombreux patients ont besoin de plusieurs traitements de l'intestin et, en l'absence de traitement ou de guérison, la constipation causée par les opioïdes peut entraîner une obstruction intestinale nécessitant alors des interventions physiques, telles que des lavements.

Relistor^{MC} est un antagoniste des récepteurs opioïdes qui bloque les récepteurs opioïdes périphériques dans le tractus gastro-intestinal. Les études ont démontré l'effet laxatif immédiat de Relistor^{MC}, dans les 4 heures suivant son administration¹. Relistor^{MC} est injecté par voie sous-cutanée (c.-à-d. sous la peau) tous les deux jours selon les besoins.

Les coûts annuels du traitement par Relistor^{MC} peuvent varier de 152,00 \$ à 3 468,00 \$, selon l'usage. De nombreux clients de SécurIndemnité obtiendront le remboursement complet de Relistor^{MC} par leurs listes de médicaments existantes. Étant donné que Relistor^{MC} est un produit délivré sur ordonnance dont l'indication est très limitée, il sera probablement uniquement prescrit à des patients atteints d'une maladie avancée recevant des soins palliatifs. Pour ces raisons, Relistor^{MC} sera remboursé sous autorisation spéciale pour les clients inscrits au service de listes de médicaments de SécurIndemnité.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires au sujet de Relistor^{MC}, veuillez communiquer avec Shellina Sevany, directrice, Services cliniques, au 905-949-3025 ou au 1-888-479-7587, poste 3025.

Recommandation : Autorisation spéciale

SécurIndemnité se réserve le droit de modifier en partie ou en entier ses lignes guides sur ses programmes d'Autorisation Spéciale.

Bibliographie :

- 1) Relistor^{MC} Dossier de demande de remboursement par les assureurs privés. Wyeth Canada, août 2008.
- 2) Pappagallo M. Incidence, prevalence, and management of opioid bowel dysfunction. *Am. J. Surg.* 2001; 182(suppl 15): 11S-18S.
- 3) Knowles CH, Martin JE. Slow transit constipation: a model of human gut dysmotility. Review of possible aetiologies. *Neurogastroenterol Motil* 2000; 12:181-196.

