

# ÉVALUATION DE MÉDICAMENT

Juillet 2022



## Uceris® – La seule mousse rectale au Canada pour les adultes souffrant de colite ulcéreuse

La colite ulcéreuse (CU) est une maladie intestinale inflammatoire qui se caractérise par des diarrhées, des douleurs d'estomac, des saignements rectaux et un besoin urgent d'aller à la selle. Aux alentours de 2030, la colite ulcéreuse pourrait toucher 436 personnes sur 100 000 Canadiens. Cette maladie touche principalement les hommes et les femmes âgés de 15 à 30 ans, mais elle peut apparaître à tout moment et à tout âge. La colite ulcéreuse peut être particulièrement difficile pour les personnes en âge de travailler en raison de l'absentéisme au travail lié aux symptômes, de l'augmentation des coûts des soins de santé et de la détresse psychologique.

Le but du traitement est de gérer efficacement les symptômes, de réduire les consultations médicales, d'améliorer la qualité de vie et d'améliorer l'observance thérapeutique. Les corticostéroïdes rectaux sont recommandés comme traitement de deuxième intention pour les patients qui ne répondent pas de manière satisfaisante aux suppositoires rectaux de 5-aminosalicylate (exemple : les suppositoires à base de mésalamine). Avant l'approbation d'Uceris®, Entocort® (budésonide) était le seul corticostéroïde rectal disponible au Canada, sous forme de lavement. Ce médicament a toutefois été associé à une administration pénible, à des douleurs, à un inconfort, à une constipation et à l'abandon du traitement qui en a résulté.

Uceris®, qui est aussi du budésonide mais sous forme de mousse, a été principalement conçu pour améliorer l'observance du traitement, la facilité d'administration et le confort.

Comparé à Entocort®, une étude a démontré que 84 % des patients préféraient Uceris®, seulement 6 % de ces patients préféraient Entocort®, alors que 10 % des patients n'avaient pas de préférence.

Uceris® est une mousse corticostéroïde rectale qui représente une option thérapeutique sûre, efficace et facile à administrer pour les patients souffrant de colite ulcéreuse. Le schéma posologique recommandé est de 1 dose mesurée (2 mg) par voie rectale deux fois par jour pendant 2 semaines, puis une fois par jour pendant 4 semaines. Le coût d'Uceris® est 400 \$ pour un cycle de traitement de 6 semaines, ce qui est comparable aux autres corticostéroïdes rectaux.

Compte tenu de ses avantages cliniques et de son impact positif sur la qualité de vie, Uceris® sera entièrement couvert pour les groupes Sécurlndemnité abonnés aux listes de médicaments gérés et entièrement couverts.



Nom du médicament	<b>Uceris®</b>
Ingrédient du médicament	<b>budésonide en mousse</b>
Coût annuel	<b>\$400</b>
Détails de la couverture	<b>Entièrement couvert pour les cas des listes de médicaments ouvertes et gérées.</b>

References:  
Ungaro, R. et al. « Colite ulcéreuse ». Lancet 389. 10080 (2017) : 1756-1770.

Monographie d'Uceris. Bausch Health Canada Inc. Avril 2020.  
Gross V., et al. « Comparaison du budésonide en mousse au lavement de budésonide dans les cas de proctite ulcéreuse active et de proctosigmoïdite. » Alimentary Pharmacology & Therapeutics 23.2 (2006):303-312.

Sécurlndemnité Inc. se réserve le droit de modifier en tout ou en partie ses lignes directrices relatives aux programmes d'autorisation spéciale.

©2022 ClaimSecure Inc.

